

Double Strength Children's Syrup Tempra®

Acetaminophen oral solution USP

160mg/5mL

4-11
YEARS

FAST EFFECTIVE
RELIEF OF
**FEVER &
PAIN**
DUE TO
Immunization
Colds
Flu

Medicinal ingredient: Each 5ml contains 160 mg of acetaminophen (pain reliever/fever reducer).

Inactive ingredients: • polyethylene glycol • sucrose • citric acid • sodium benzoate • sodium chloride • sodium citrate • butylated hydroxyanisole • artificial flavour • purified water • artificial colour (for cherry flavour only)

ASA free

Dosage: Use the dosage chart to determine the right dose for your child. If possible, use weight otherwise use age.

- Dose only with the dosing cup provided.
- Administer single dose orally every 4-6 hours.
- **Do not** give your child more than 5 doses in 24 hours.

Dosage			TEMPRA® Double Strength Children's Syrup 160 mg/5 mL 4 - 11 years
Weight (kg)	Weight (lbs)	Age (years)	
16 - 21.9	36 - 47	4 - 5	7.5 mL
22 - 26.9	48 - 59	6 - 8	10 mL
27 - 31.9	60 - 71	9 - 10	12.5 mL
32 - 43.9	72 - 95	11 to under 12	15 mL

WARNINGS

- **DO NOT** use with other drugs containing **acetaminophen**. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or a pharmacist.
- **DO NOT USE** if your child is allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product.
- **Liver warning:** This product contains acetaminophen. **Severe or possibly fatal liver damage** may occur if you give to your child: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen.

Symptoms of liver damage may include: • yellow of the skin/eyes, dark urine • sweating, nausea, vomiting, stomach pain • unusual tiredness, and/or loss of appetite.

- **Allergy alert:** acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include skin reddening, blisters or rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**
- **Ask a doctor before use if your child** has a liver or kidney disease.
- **Ask a doctor or pharmacist before use if your child** is taking Warfarin-containing blood thinning drugs.
- **Stop use and ask a doctor** if pain lasts for more than five (5) days or fever lasts for more than three (3) days.
- **In case of overdose:** Call a poison Control Center or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.

● KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

Safety sealed bottle. Do not use if seal is broken.

Paladin Labs Inc., Saint-Laurent, Quebec, H4M 2P2

☎ 1-888-867-7426



This insert is recyclable

© Registered trademark of Paladin Labs Inc.

Date of Revision: February 2017
301423-03

Sirop pour enfants concentration double Tempra®

Solution orale d'acétaminophène USP 160mg/5mL

4-11
ANS

SOULAGE RAPIDEMENT
ET EFFICACEMENT
**FIÈVRE et
DOULEUR**
CAUSÉES PAR
La vaccination
Le rhume
La grippe

Ingrédient médicamenteux : Chaque dose de 5ml contient 160 mg d'acétaminophène (soulagement de la douleur/ atténuation de la fièvre).

Ingrédients inactifs : • polyéthylène glycol • sucrose • acide citrique • benzoate de sodium • chlorure de sodium • citrate de sodium • hydroxyanisole butylé • arôme artificiel • eau purifiée • colorant artificiel (à saveur de cerise seulement)

Sans AAS

Posologie : Utilisez le tableau posologique pour déterminer la dose adéquate pour votre enfant. Si possible, établissez la dose en fonction du poids de l'enfant; sinon, en fonction de son âge.

- Mesurer le médicament seulement avec le verre doseur fourni.
- Administrer la dose unitaire par voie orale aux 4 à 6h.
- **Ne pas** dépasser 5 doses par période de 24 heures.

Posologie			TEMPRA® Sirop pour enfants concentration double 160 mg/5 mL 4 - 11 ans
Poids (kg)	Poids (lbs)	Âge (ans)	
16 - 21.9	36 - 47	4 - 5	7.5 mL
22 - 26.9	48 - 59	6 - 8	10 mL
27 - 31.9	60 - 71	9 - 10	12.5 mL
32 - 43.9	72 - 95	11 à moins de 12	15 mL

MISES EN GARDE

- **NE PAS** utiliser avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène**. En cas d'incertitude quant à la présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.
- **NE PAS UTILISER** en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient dans ce produit.
- **Mise en garde liée au foie :** Ce médicament contient de l'acétaminophène. Des **lésions du foie graves pouvant causer la mort** peuvent survenir si le médicament est pris : • à une dose supérieure à la dose maximale recommandée sur 24 heures • avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène. Les symptômes de lésions du foie peuvent inclure les suivants : • jaunissement de la peau et des yeux, urine foncée • transpiration, nausées, vomissements, maux d'estomac • fatigue inhabituelle, et/ou perte d'appétit.
- **Mise en garde sur les allergies :** L'acétaminophène peut provoquer de graves réactions cutanées, pouvant se présenter avec les symptômes suivants : rougeurs, cloques, éruptions cutanées. **Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin immédiatement.**
- **Consulter un médecin avant de prendre ce médicament si votre enfant** souffre d'une affection du foie ou du rein.
- **Consulter un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser ce médicament si votre enfant** prend un anticoagulant à base de Warfarine.
- **Cesser d'utiliser le médicament et consulter un médecin** si la douleur persiste plus de cinq (5) jours ou la fièvre persiste après trois (3) jours.
- **En cas de surdose** appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.

● GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Flacon scellé. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Laboratoires Paladin inc., Saint-Laurent (Québec) H4M 2P2

☎ 1-888-867-7426



Ce feuillet est recyclable

© Marque déposée des Laboratoires Paladin inc.

Date de révision: Février 2017
301423-03