

Infant Drops Tempra®

Acetaminophen oral solution USP 80 mg/mL

FAST EFFECTIVE RELIEF OF
FEVER & PAIN
DUE TO
Immunization
Teething
Colds or flu

0-23
MONTHS

Medicinal ingredient: Each 1 ml contains 80 mg of acetaminophen (pain reliever/fever reducer).

Inactive ingredients: • polyethylene glycol • propylene glycol • glycerin • sodium saccharin • sodium citrate • citric acid • artificial flavour • purified water • artificial colour (for cherry flavour only)
Sugar and ASA free (sweetened with saccharin sodium)

Dosage: Use the dosage chart to determine the right dose for your child. If possible, use weight otherwise use age.

- Dose only with the dropper provided.
- Administer single dose orally every 4-6 hours.
- **Do not** give your child more than 5 doses in 24 hours.

Dosage			TEMPRA® Infant Drops 80 mg/mL 0 - 23 months
Weight (kg)	Weight (lbs)	Age	
2 - 5.4	6 - 11	0 - 3 months	0.5 mL
5.5 - 7.9	12 - 17	4 - 11 months	1.0 mL
8 - 10.9	18 - 23	12 - 23 months	1.5 mL

WARNINGS

- **DO NOT** use with other drugs containing **acetaminophen**. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or a pharmacist.
- **DO NOT USE** if your child is allergic to acetaminophen or any other ingredient in this product.
- **Liver warning:** This product contains acetaminophen. **Severe or possibly fatal liver damage** may occur if you give to your child: • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen.
Symptoms of liver damage may include: • yellow of the skin/eyes, dark urine • sweating, nausea, vomiting, stomach pain • unusual tiredness, and/or loss of appetite.
- **Allergy alert:** acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include skin reddening, blisters or rash. **If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**
- **Ask a doctor before use if your child** has a liver or kidney disease.
- **Ask a doctor or pharmacist before use if your child** is taking Warfarin-containing blood thinning drugs.
- **Stop use and ask a doctor** if pain lasts for more than five (5) days or fever lasts for more than three (3) days.
- **In case of overdose:** Call a poison Control Center or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Safety sealed bottle. Do not use if seal is broken.

Paladin Labs Inc., Saint-Laurent, Quebec, H4M 2P2

☎ 1-888-867-7426



This insert is recyclable

© Registered trademark of Paladin Labs Inc.

Date of Revision: February 2017
301420-04

Gouttes pour nourrissons
Tempra[®]

Solution orale d'acétaminophène USP 80 mg/mL

0-23
MOIS

SOULAGE RAPIDEMENT
ET EFFICACEMENT
**FIÈVRE et
DOULEUR**
CAUSÉES PAR
La vaccination
La dentition
Le rhume ou la grippe

Ingrédient médicamenteux : Chaque dose de 1 ml contient 80 mg d'acétaminophène (soulagement de la douleur/ atténuation de la fièvre).

Ingrédients inactifs : • polyéthylène glycol • propylène glycol • glycérine • saccharine sodique • citrate de sodium • acide citrique • arôme artificiel • eau purifiée • colorant artificiel (pour la saveur de cerise uniquement)

Sans sucre ni AAS (édulcoré avec de la saccharine sodique)

Posologie : Utilisez le tableau posologique pour déterminer la dose adéquate pour votre enfant. Si possible, établissez la dose en fonction du poids de l'enfant; sinon, en fonction de son âge.

- Mesurer le médicament seulement avec le compte-gouttes fourni.
- Administrer la dose unitaire par voie orale aux 4 à 6h.
- **Ne pas** dépasser 5 doses par période de 24 heures.

Posologie			TEMPRA [®] Gouttes pour nourrissons 80 mg/mL 0 - 23 mois
Poids (kg)	Poids (lbs)	Âge	
2 - 5,4	6 - 11	0 - 3 mois	0,5 mL
5,5 - 7,9	12 - 17	4 - 11 mois	1,0 mL
8 - 10,9	18 - 23	12 - 23 mois	1,5 mL

MISES EN GARDE

- **NE PAS** utiliser avec d'autres médicaments contenant de l'**acétaminophène**. En cas d'incertitude quant à la présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.
- **NE PAS UTILISER** en cas d'allergie à l'acétaminophène ou à tout autre ingrédient dans ce produit.
- **Mise en garde liée au foie :** Ce médicament contient de l'acétaminophène. Des **lésions du foie graves pouvant causer la mort** peuvent survenir si le médicament est pris : • à une dose supérieure à la dose maximale recommandée sur 24 heures • avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène. Les symptômes de lésions du foie peuvent inclure les suivants : • jaunissement de la peau et des yeux, urine foncée • transpiration, nausées, vomissements, maux d'estomac • fatigue inhabituelle, et/ou perte d'appétit.
- **Mise en garde sur les allergies :** L'acétaminophène peut provoquer de graves réactions cutanées, pouvant se présenter avec les symptômes suivants : rougeurs, cloques, éruptions cutanées. **Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, arrêter l'utilisation du produit et consulter un médecin immédiatement.**
- **Consulter un médecin avant de prendre ce médicament si votre enfant** souffre d'une affection du foie ou du rein.
- **Consulter un médecin ou un pharmacien avant d'utiliser ce médicament si votre enfant** prend un anticoagulant à base de Warfarine.
- **Cesser d'utiliser le médicament et consulter un médecin** si la douleur persiste plus de cinq (5) jours ou la fièvre persiste après trois (3) jours.
- **En cas de surdose** appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.

● GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Flacon scellé. Ne pas utiliser si le sceau est brisé.

Laboratoires Paladin inc., Saint-Laurent (Québec) H4M 2P2

☎ 1-888-867-7426



Ce feuillet est recyclable

© Marque déposée des Laboratoires Paladin inc.

Date of révision: Février 2017
301420-04